

66

question proposée par
L'Académie Royale de
Chirurgie établie à Paris
L'année 1732.

Pourquoy Certaines tumeurs doivent
estre extirpées, & d'autres simplement
ouvertes; Dans l'une et L'autre de ces
operations, quels sont les cas ou le caustere
est préférable à l'instrument tranchant,
Et les raisons de préférence.

Avant que d'entres en matiere sur la
question proposée, il paroît necessaire de poser
pour principe, qu'il y a divers genres de tumeurs,
que les Causes qui les produisent ne sont point
les memes, et que par une Consequence de
necessité, on doit proceder a leur guérison par
des voyes différentes.

Les tumeurs en effet sont ou humorales, ou
Caussées par des vens et connues sous le nom
d'emphezemes, d'autres aulty provenant du
relachement des parties solides, par leur
mauvaise disposition, se rapportent a la prociidence.



de l'anus, a la chute de l'uterus et autres
semblables.

Les tumeurs humorales reconnoissent pour cause
des vaisseaux dilatés au dela de leur tone
naturel, par le steiour des Suc, qui quoyque
doux dans le principe de la Congestion, deviennent
dans la suite d'une nature grossiere, viciee et
Capables de fermentation; ces sortes de tumeurs
se faisant subitement, sont accompagnées de
douleurs, chaleur, pulsation et fièvre, doivent
estre simplement ouverts apres la cessation
des premiers symptomes, avec l'instrument
tranchant par une bonne ouverture qui
evacue le pus tout a la fois; ou bien par le
Cautere potentiel dans Ceux qui craignent
le fer, et Cela dans Certaines parties.

A ces tumeurs Chaudes on peut rapporter la
maniere dont il faut traiter toutes sortes
d'abcès, les erysipèles phlegmoneux, les
aneurismes, les contusions avec epanchement
les entorses, les Charbons, les hydroceles, et
generalement toutes les tumeurs humorales.

quand on avance que les abcès doivent
estre ouverts avec l'instrument tranchant,
ou avec le cautere potentiel, dans Ceux qui
craignent le fer, nous entendons parler, dans
Certaines parties qu'ils occupent. Comme a
la Cuisse, au bras, aux lombes, sur le ventre

et quelques autres parties, ou l'on peut
appliquer un caustere dans les absces que l'on
traite suite des inflammations precedentes
et que l'on conduit pour ainsi dire au but
que l'on se propose: dans ces sortes de tumeurs
il est indifferent de se servir de l'instrument
tranchant, ou du Caustere.

il n'en est pas de meme des absces qui occupent
des parties delicates, et qu'il faut menager avec
un soin infini, par exemple toutes les especes
de panaris, tant ceux qui se font dans la
guaine des tendons, que ceux qui viennent
sous le perioste, ou meme dans le Corps
graisseux, les absces qui viennent au coin
des yeux, sur le nez, sur les joues, et generalement
sur tout le visage, les absces qui Critiques et
qui se font dans moins d'un jour; toutes les
tumeurs doivent estre ouvertes avec l'instrument
tranchant, et non par le caustere pour
deux raisons.

La premiere se tire de ce que les parties qu'on
vient de designer sont d'une composition
nerveuse susceptibles par consequent de
l'impression d'un caustique, dont on n'est pas
maître de borner les progrès dans son application
le fer au contraire decouvre tout ce qui est
necessaire sans aucun danger.

La seconde parce que dans ces sortes de tumeurs



La matiere y recoit un degre de Chaleur, de
fermentation et de pouture au dessus des ordinaires
qu'il ne permet pas d'en differer l'ouverture très-
souvent d'une heure a autre, par les progrès
et le desordre des parties voisines, sans exposer
un malade a un danger evident; Cela se voit
ordinairement dans les panaris qui se forment
dans la gaine des tendons, ou sous le perioste,
maladies qui ont souvent fait perir les malades
pour n'avoir pas hâté l'ouverture de ces tumeurs.
mais si l'est incontestable, que Cela arrive demême
dans le panaris en differente ouverture, que ne
doit on pas juger des absces critiques, dont la matiere
Corrompue Communique souvent avec la matiere
des liqueurs, des sucs propres a l'alterer de nouveau
par un mouvement fébrile qui occasionne une
delitescence mortelle, ^{ou} qui est au moins suivie
de funestes accidens, comme l'incube, cardialgie,
ou fièvre putride, qui devient plus maligne
même que la premiere maladie, si n'arrive
quelque évacuation sensible, comme cours
de ventre, flux d'urine, ou une sueur
copieuse qui dissipe ce levain; il faut donc
conclure que puisque l'action du caustere est trop
lente, l'instrument tranchant convient mieux
dans ces cas.

C'est aussy pour les erysipeles phlegmoneux
qu'est destiné l'instrument tranchant, par
preference a toutes sortes de causteres, on voit
tous les jours en pratique un heureux succès

Des incisions convenables dans ces maladies, on
en voit au contraire de fort malheureux par
l'application des caustiques, parce qu'ils retardent
la suppuration, et la partie reste engorgée des
sucs pourrissants dont l'action se tourne sur les
parties voisines, la fièvre en devient plus ardente.
Il faut cependant convenir que les caustiques
d'une certaine nature deviennent souvent
préférables à l'instrument tranchant, dans ces
mêmes tumeurs; lorsque les tegumens tombent
en pourriture, par l'infection de la masse du sang,
qui fournit un leuain qui saute de plus en
plus en abondant dans la partie affligée, ce qui
occasionne un commerce de corruption, que
l'on ne peut interrompre, qu'en cautérisant
l'embouchure des vaisseaux de communication
par un caustic liquide; ce que l'instrument
ne sauroit faire, et c'est la raison pour laquelle
quand on s'en sert opiniâtrément, on est tous
les jours à même de continuer les incisions
souvent même des taillades, jusqu'à ce qu'on
ne trouve plus moyen de les places, à cause
du progrès du mal, qui ne s'arrête souvent
qu'avec la vie du malade.

Tout le monde sait que les entrax sont des
tumeurs inflammatoires et fort dures, que la
lymphe a plus de part à l'épanchement que la
partie rouge, et que c'est le propre de cette
humeur de se durcir par la chaleur lorsqu'elle



Est épanchée, mais tous ne font pas peut être
attention à la difficulté de leur prompt
guérison, ce qui provient sans doute de ce que
l'on ne connoît toujours le véritable degré de
leur maturité; cependant cette limphe se
liquifie bien tôt et devient propre à faire
ébouriffer une profonde fluctuation, et pour
voir la tumeur quoique plate semble vouloir
s'ouvrir par plusieurs trous comme un criblé,
ce qui marque qu'il faut l'ouvrir sur le
moment avec l'instrument tranchant, par
une profonde incision proportionnée au
volume de la tumeur, nous disons avec le fer
parce qu'il est préférable au cautère, en ce que
l'action de ce dernier causeroit une douleur
plus vive, qu'il augmenteroit l'inflammation
la dureté de la tumeur, et empêcheroit une
plus prompte suppuration, qui est néanmoins
ce qui soulage le malade, et appaise
tous les symptômes.

L'ancienne coutume étoit d'extirper les charbons
sur tout ceux qui arrivoient dans un temps de
peste; cette pratique a paru contraire à
l'expérience, et a fait voir en plusieurs occasions
que les malades qui ont été ainsi traités ont
été les victimes de cette méthode, on n'en
sera pas surpris si l'on fait attention que
cette tumeur est autant au dessus de toutes
les inflammations extraordinaires, que Cellery

Le sont au dessus des ordinaires; rien n'est plus
outré dans l'habitude du corps que la naissance
de cette tumeur, rien autre ne sauroit exciter
une plus vive douleur qu'un engagement
subit, mais la chaleur excessive qu'elle cause
ne paroît pas devoir venir de la célérité avec
laquelle cet embarras se fait, il est plus
seus de croire que la chaleur brûlante qui
accompagne cette tumeur, est causée par la
Constitution de la masse des liqueurs, qui
dans cet état de congestion se trouve sèche
et brûlée, manquant par la d'un véhicule
propre à atténuer les parties, celles qui
sont embourbées par les sucs brûlants et arides
laissent échapper à travers leurs pores une
ferorité d'un même caractère, laquelle se
trouve augmentée par la rarefaction du
Corps muqueux; cette ferorité brûlante
tient son action sur la peau et sur le
Corps gras, qui en sont gangrenés en
très peu temps.

Sur ce principe on peut solidement conclure
que de tous les moyens le plus pernicieux
c'est celui d'extirper jupitoyablement
une tumeur de ce caractère, et il est bien
evident qu'une semblable opération doit
augmenter l'irritation de la partie souffrante
et attirer des accidens funestes, sur tout



Dans un état fébrile comme est celui des Charbons; il est uay toutes fois qu'il y a des personnes qui ont Souuent des pustules Charbonneuses en plusieurs endroits du corps sans qu'il y ayt que peu d'inflammation ni Souuent fièvre, ce sont les cas ou la douleur ni la chaleur ne se font presque pas sentir, il faut considerer ces sortes de pustules dependantes d'une cause legere, puisqu'il n'a pour lors que le corps muqueux qui soit rarefié dans l'endroit ou l'embaras s'est fait, aussy ne fait on pas grand cas de semblables pustules, qui guerissent fort vite, apres qu'on les coupees avec la pointe des ciseaux, et baignées avec de l'eau de mie.

Il n'en est pas de meme dans les uays Charbons dont nous entendons parler, car apres auoir ouuert la uettie qui est sur le milieu de la tumeur, et scarifié ce qui est alteré par la serosité brulante, il faut y appliquer des topiques emmolliens, resolutifs et spiritueux, pour appaiser la grande inflammation, & attirer quelque suintement dans la partie affectée, il n'est pas extraordinaire de les resoudre, ni meme que cette resolution n'ayt pas causé de plus facheux symptomes; ce sont des tumeurs qui veulent estre traitées avec des moyens doux, l'esperiance en est familiere; il est uay de dire neanmoins que le charbon

bien caractérisé est toujours mortel, lorsqu'il vient à la face quelque secours qu'on emploie ce fait est vérifié par les auteurs et par plus de vingt expériences que nous avons eues. mais il est très curable en d'autres endroits et lorsque l'on voit que les remèdes doux ne suffisent, ^{on} les peut faire tomber en les cernant avec un caustique liquide (par exemple le beurre d'antimoine) sans presque de douleur, et pour lors la suppuration vient plus vite que si on les avient extirpés avec l'instrument tranchant, dont la vive douleur augmente tous les symptômes.

Les hydroceles par épanchement sont des tumeurs qu'on doit nécessairement ouvrir, et souvent même emporter par ligature, lorsque le kiste se trouve trop épais, ou que le testicule est altéré, ce qui cause l'épanchement de la sérosité et produit la maladie en question; il ne sera pas peut-être hors de propos de rapporter icy une méthode aussi prompte qu'elle est ingénieuse, pour la guérison radicale des hydroceles par épanchement.

pour cet effet, faites une incision de deux travers de doigts, jusques sur le cordon des vaisseaux spermaticques à l'endroit où ils sortent par l'anneau de l'oblique externe en descendant vers le scrotum, dégagé le cordon avec les doigts jusques dans la bourse



tirés ensuite de force, et sans rien craindre le
Cordon sans le muvoir entre les doigts, en faisant
ventres avec l'autre main le Scrotum sans dessus
dessous, et faisant passer le testicule avec tout
le kiste par la playe, et si la tumeur se
trouvoit trop grosse, uvidés auparavant
La poche en y donnant un coup de lancette
ou de troiscarts, a lors vous n'aurez aucune
peine, ouvrés ensuite ce kiste pour examiner
le testicule, et s'il n'est point altéré, lavés
le avec de l'eau de vie forte, remettez le
dans la bourse a travers l'incision, faites en
la ligature si haut qu'il sera possible avec
un ruban de fil bien fort et ciré sans
toucher au cordon spermatique, coupez le
superflus de ce sac membraneux avec des
Ciseaux, et appliquez un cautere ardent
proportionné, sur ce bout qui est lié, mettez
sur la playe du sang de dragon en poudre
un plumaceau de charpi sec, et sur la
bourse une embrocation d'huile rosat
Chaudes, des compresses et un bandage
Contentif, les jours suivans pansez cette
playe avec le tiers de baume d'arcens
et deux tiers de baume samantain,
Continuez les embrocations, et memes les
saignées, au commencement, il survient
une fièvre le second ou le troisieme jour
qui se dissipe dans vingt quatre heures
et le dix ou le douzieme jour la playe

Est consolidée sans beaucoup de suppuration —
hors celle qui est nécessaire pour la chute de
la ligature, et la réunion des chairs; Cette
méthode peut être employée pour les tumeurs
réductibles, lorsqu'on ne veut pas s'affaiblir
à porter des bandages, on peut aussi faire
la Castration de la même manière, si elle
devient nécessaire, avec moins de danger
qu'en ouvrant toute la bourse; nous
l'avons appris ainsi de l'expérience dans
des occasions, qui se sont offertes, et nous
avons cru le devoir communiquer au
public.

Après avoir détaillé aussi succinctement
qu'il nous a été possible les tumeurs qui
doivent être traitées par simple ouverture
et avoir rangé parmi ceux là, celles qui se
font subitement, hors l'hydrocele, que nous
avons mis tout de suite à cause de la
ressemblance du traitement, avec les tumeurs
qui ne doivent être que simplement
ouvertes; nous croyons maintenant de nous
devoir attacher à celles qui se font d'une
manière lente et presque insensible, et qui
exigent l'extirpation en entier; on peut
rapporter à ces tumeurs, les glandes stériles,
lorsqu'elles commencent à devenir douloureuses
les carcinomes, les tumeurs variqueuses et
anéurysmales, le talpa taupinaria, et



généralement toutes les tumeurs enkistées, —
Comprises sous le nom d'athéroma, Steatoma
et meliceris, à moins que la matière que
ces dernières tumeurs contiennent ne soit serueuse
ou purulente, et que le kiste ne soit pas —
trop épais et endurci, dans ce cas seulement
il suffit de faire une bonne ouverture —
de l'étendue de la tumeur, d'importer tout
ce que l'on peut du kiste, et de consumer
le reste par des caustiques, en y attirant
une suppuration suffisante avec les
poussières, mais hors ce cas nous croyons
que ces tumeurs doivent être extirpées —
avec l'instrument tranchant, et non pas
simplement ouvertes, cela est fondé sur
l'expérience, car si on ouvre simplement
quelqu'une de ces tumeurs, il est impossible
d'en obtenir la guérison, et la raison physique
de cet obstacle se tire de ce que les tumeurs —
dont il est question, reconnoissent pour cause
une lymphe endurcie et vicieuse dans les
propres vaisseaux dans les unes, et les autres
un sang artériel ou veineux, qui font tout
le volume de la tumeur, ces vaisseaux étant
devenus variqueux, par le séjour et l'abord —
continu des liqueurs, et ayant acquis
beaucoup d'étendue en tout sens, ils ne
pourroient se fondre ni se réduire en
suppuration par tous les topiques de l'art,
les vaisseaux étant des parties extensibles

jusqu'à un certain point, ne sauroient revenir
à leur premier état, parceque la matiere
propre des parties molles, aussy bien que des solides,
ne se liquifie point, quand les vaisseaux ont
perdu la vertu élastique, pour se confirmer
dans cette idée, on n'a qu'à remarquer ce qui se
passe dans le Corps d'un animal, ou dans une
de ses parties, qu'on aura mis dans un alambic
pour en tirer toutes les humeurs par la distillation
ou en viendra à bout par le secours du feu,
mais la matiere propre qui constitue les
vaisseaux de toutes ces parties restera dans
son entier, sous la même forme, et dans la
même grandeur qu'on li avoit mis, on le
trouvera seulement très poreux et fort
léger, parceque l'air extérieur remplit les
Cavités que les Sucs ont été obligés d'abandonner,
d'où il est aisé de conclure que les tumeurs
de cette espee doivent être absolument
extirpées, si on veut en obtenir une parfaite
guérison, puisque si on les ouvroient simplement
on n'oteroit point la véritable cause, qui
consiste dans le développement outré des
parties solides, et qu'on ne peut détruire
que par une extirpation en entier de la
tumeur; on objectera peut être, pourquoy
la resolution de certaines glandes, des tumeurs
enkistées, des nodus, des exostoses mêmes par
l'usage des antiueneriens, et autres remèdes



fondans, a cela nous repondons, que lorsque les vaisseaux sont encore extensibles, et qu'ils n'ont pas été dilatés au delà de leur état naturel, on n'entreprend jamais les extremes remèdes qui sont le fer et le feu, qu'on n'ayt fait précéder les remèdes ordinaires, mais — lorsque ces remèdes échouent, qui sont au bout de la nature, sont sans aucun effet, on juge que tout est excédé de la part des solides et que leur oscillation en est perdue.

Une seconde raison se presente encore en faveur de l'extirpation de ces tumeurs, ce qu'il est aisé de détruire et d'emporter tout d'un coup, toujours l'effet, et presque toujours la cause de ces tumeurs nous ditons l'effet, puisqu'il est presque impossible de ne pas guérir une tumeur de ce caractère si on l'enlève sans laisser le moindre germe aux environs, nous disons — même souvent la cause, attendu que — presque toute la force énergique, du tissu de ces maux, est souvent renfermée dans la tumeur même, sans que la communication insensible qui s'en fait, soit en état de résister aux remèdes qu'on emploie pour la combattre.

une prompte guérison est toujours — le but qu'on doit se proposer dans la cure des maux de cette espèce, et tout ce qui vient d'être dit doit faire conclure en faveur de l'instrument tranchant dans les cas qu'on vient d'exposer. Car si on employoit le cautère

Son action seroit trop lente pour remplir cette
uie, et avant que la Chute de l'escave se fit
dans une tumeur, occulte, dure et renitente
on courroit risque de donner du mouvement
a une humeur endurcie dans ces propres
vaisseaux, de la faire rentrer en partie dans
le Commerce des liqueurs, et d'exciter presque
infailliblement une fièvre lente, que l'on
doit éviter, pour pouvoir tenter une prompte
reunion, solide, et sans recidive, puis qu'on
doit être certain que ces maux, ne sont
guérissables, qu'entre les mains des personnes
timides, qui craignent les innocentes boucheries,
Car il ne faut pas épargner les teguments lors
qu'ils sont gâtés, ni les autres parties qui
peuvent être infiltrées des mauvais sucs,
qu'on veut détruire, et qui sont le germe
de la renaissance de ces tumeurs, lorsqu'on
a voulu trop épargner un malade; il s'agit
donc de ne rien ménager quand une tumeur
est extirpable, puisqu'il faut absolument
emporter, toutes les callosités qui sont aux
bords, dans le fonds, et dans tous les endroits où
la tumeur s'attache, comme seroit par exemple
un cancer; il est d'usage de ne voir jamais
une reunion parfaite sans toutes ces précautions,
autrement on a le malheur de voir renaître
des tubercules dans quelque endroit des bords,
ou même dans le milieu, lorsque la reunion
est prête à se faire, et cela ne vient



que parce que le corps grailleux, ou la peau
des bords étoient infiltrés des Sucs du même
Caractere que le Corps de la tumeur, et
n'ayant pas été emportés dans le moment
de l'extirpation, les leuains sequestrés se
mettent ensuite en mouvement par l'action
des topiques, qui les font augmenter d'insensible-
ment, de volume, c'est à lors qu'on voit
revenir un mal que l'on croyoit guéri.

Il semble par tout ce que nous venons
de dire que l'action des cauterés soit absolument
inutile, et que nous donnions par tout la
préférence à l'instrument tranchant, que nous
regardé jusqu'icy, comme l'ancre sacrée, qui
arrête et détruit tout ce qui se présente; mais
comme nous n'avons parlé que des tumeurs
occultes, auxquelles l'expérience montre que
leur application est pernicieuse, nous nous
sommes réservés dans cet endroit de dire qu'il
est plus possible de guérir les carcinomes et
les cancers ulcérés, par les cauterés, et l'effet
des caustiques que par l'instrument tranchant,
nous pourrions rapporter plusieurs exemples
des guérisons entières sans recidive, lorsque ces
tumeurs n'attaquent pas la face, nous nous
contenterons dans cet endroit de communiquer
au public la méthode que nous avons
pratiquée dans une semblable rencontre
quoy qu'elle n'ayt pas eu un parfait succès
dans la suite. Comme l'on verra après-mais
nous aimons mieux détailler un mal
extraordinaire, avec toutes ses circonstances
pour en instruire le public, que de raconter

D'autres faits d'une moindre importance.
une personne âgée d'environ trente cinq ans
avoit une tumeur Carcinomateuse, a la partie
moyenne intérieure et postérieure de la Cuisse
de la pesanteur de deux livres ou environ,
laquelle avoit commencé par une glande
roulante de la grosseur d'une châtaigne, que
le malade porta pendant un an, négligeant
de la faire extirper; il aimait mieux se faire
appliquer un emplâtre de de Vigo, de diabolium
et semblables dans la vue de la foudre, mais ces
topiques exciterent dans trois ou quatre mois
une irritation a la peau qui causa une fermentation
a l'humeur renfermée, et qui augmenta le volume
de cette glande jusqu'à un point extrême, et la
fit ouvrir en forme d'une grenade, d'où il
suintoit une sérosité brûlante et infecte, qui
eut la force dans peu de tems de ronger des
vaisseaux sanguins dilatés dans la tumeur, et
de causer des hémorragies périodiques, jusqu'à
une livre de sang et même au delà, chaque
fois que l'éruption se faisoit, le malade étant
devenu fort décharné par des évacuations
fréquentes, et par la fièvre lente, demeura dans
cet état pendant six mois, après lequel tems,
il fut conclu par les médecins et chirurgiens
de Bayonne, qu'il falloit extirper cette tumeur
le malade étant préparé par l'opium minéral
la tiranne sudorifique, les purgatifs, et le lait d'ânesse



il eut encore la faiblesse d'éluder l'opération plus
de deux mois, ce qui le réduisit dans un état
pitoyable, par le détreichement la fièvre lente,
et les évacuations, et le mit en danger de supputer
l'opération, néanmoins desirant de guérir, il
résolut de se faire extirper la tumeur, et s'étant
déterminé à nous choisir pour l'opération, par la
confiance qu'il avoit d'ailleurs en nous, nous
commencâmes d'abord par la visite de la tumeur
et nous crûmes pouvoir l'appréhender par les observations
que nous fîmes, qu'une récurrence étoit fort à craindre
et que nous pensions qu'elle pourroit être occasionnée
tant par l'infection et l'appauvrissement de la matre
de son sang, que par ce qu'il falloit nécessairement
emporter une grande étendue des tegumens qui
étoient infiltrés des sucs qui suintoient déjà depuis
long tems par l'ouverture de la tumeur, ce qui
occasionneroit une cicatrice de longue haleine
qui serviroit dans la suite des panchemens d'un écoulement
aux humeurs viciées qui étoient déjà entrées
dans le commencement de toutes les liqueurs, et qui
formeroient un obstacle presque invincible à
une parfaite guérison.

nous nous servîmes de l'instrument tranchant
avec lequel, nous emportâmes la tumeur, qui
étoit adhérente aux muscles flexisseurs de
la jambe, nous anticipâmes au delà des bords
infiltrés, en sorte qu'il ne resta plus aucune
dureté, nous fîmes trois points de ligature aux
arteres qui communiquoient à la tumeur, nous
panchâmes dans la suite cette playe avec un
digestif simple jusqu'à ce que tout fut à niveau
nous crûmes que la guérison étoit sûre au bout
de cinq semaines, et ne devois rien craindre du côté
de la récurrence que nous avions prédit, attendu que

les chairs étoient fort belles unies, et la cicatrice
ferme, jusqu'aux deux tiers de l'abrévement que
nous avions été obligés de faire, quand tout à
coup et d'une manière imprévue il se forma trois
bouttons indolens, de la grosseur de petites noisettes
en forme de champignons, au milieu de la plaie.
nous mimas d'abord la pierre infernale que nous
appuyâmes très fort pour les consumer, le lendemain
nous les trouvâmes fort gros, au lieu d'avoir
diminué, nous nous servîmes de l'alume calciné
du précipité rouge, du buvre d'antimoine, rien
de tout cela n'empêcha pas l'accroissement, au
contraire, ils sembloient augmenter tous les jours
de plus en plus, nous proposâmes de les emporter
avec le bistouri et la pointe des ciseaux, le malade
s'y opposa pendant cinq ou six jours, cependant ces
excroissances devinrent de la grosseur d'un œuf
de poule, nous en fîmes pour lors l'extirpation
aussy avant qu'il nous fût possible, ce qui fut
suivi d'une violente hémorragie, dont nous
nous rendîmes les maîtres avec deux points
d'équille, que nous appuyâmes fort avant, à
cause que les excroissances emportées s'insinuoient
jusques dans l'intérieur des muscles, nous crûmes
par cette seconde opération avoir mis le malade
hors de toute recidive, et luy procurer une
guérison infailible, mais nous fûmes bien
trompés le lendemain en levant l'appareil, puis
que nous trouvâmes les excroissances que nous
crûmes avoir emporté radicalement, presque
aussy élevées que le jour avant l'opération, ce
phénomène ne nous étonna pas peu, et ne nous
découragea pas néanmoins, nous prîmes le parti
au contraire le parti d'attaques de nouveau



Cet hidre formidable; dans moins de huit jours —
nous éprouvâmes plusieurs caustiques dans la vue
de reprimer des chairs si rebelles, elles ne firent que
croître et s'élargir comme de la corne, le malade
qui étoit rebuté de tous les remèdes tant internes
qu'externes, dont il n'avoit jamais cessé de faire
usage, étoit devoré par la fièvre lente qui
augmentoit toujours, fut mis par délibération
dans l'usage des frictions mercurielles sur la partie
malade pendant plusieurs jours, et tout cela sans
aucun succès, la tumeur reprenoit son premier
état, et le malade désespéré d'en guérir, vouloit
l'abandonner au soin de la ~~tumeur~~ nature, nous
le laissâmes voules dans cet état pendant
quelques jours, et luy proposâmes ensuite une
voïe pour détruire cette tumeur sans le secours
deses, il nous laissa faire a cette condition.

nous fîmes un mélange de sublimé corrosif, d'arsenic
et de poudre a canon parties égales réduit en
poudre très fine, nous l'appliquâmes sur le
Carcinome avec du charpi sec, nous laissâmes
travailler ce caustique jusqu'au lendemain, le
malade étant dans une souffrance terrible, la
fièvre augmenta, la milie devint enflée
il survint un cours de ventre qui dura vingt
quatre heures, nous luy donnâmes vingt gouttes
anodines pour calmer ses douleurs, et nous eumes
recours a ce remède pendant quelques jours, la
saignée fut aussy mise en usage, et l'embrocation
d'huyle rosat sur toute la cuisse, tous les symptômes
furent calmés le lendemain, hors la tumeur qui
grosit par une fermentation au double, et devint
comme la tête d'un enfant nouvellement né,
sans aucune douleur, nous mîmes de ses poudres
avec de l'huyle commune dont nous frotâmes
la tumeur vis le jour avec la barbe d'une plume

et par dessus du charpi sec et l'appareil comme a
l'ordinaire, nous continuâmes a faire la meme chose
pendant neuf ou dix jours, apres lequel temps la tumeur
commença a seicher et les bords a s'humecter d'un pus
qui paroittoit louable, nous garnîmes des plumaceaux
avec le baume des larmes de pin, pour hâter
la chute de l'escarre, qui tomba le seizieme jour
et nous laissa encore voir un bouton de chair vive
de la grosseur d'une noisette, nous y venîmes des
poudres, il tomba dans huit jours, apres quoy nous
n'appercûmes aucune dureté, nous pansâmes la
playe avec le meme baume, laquelle fut entiere.
Cicatrisée vingt jours apres la chute du dernier
escarre; le malade acquit ensuite un emboupoint
qu'il n'auoit jamais eu, il parut aussy droit et
ferme sur la cuisse que s'il n'eust eu aucun mal
montant a cheval pour continuer ses fonctions
ordinaires, ce qu'il entreprit peut estre un peu
trop tost, puisqu'il meustroit la cicatrice qui
estoit bien ferme et unie, et quatre mois apres
sa guerison par faite, il luy sortit un champignon
environ deux travers de doigts du côté de la
cicatrice, qui augmenta prodigieusement, nous
fûmes appellez de nouveau pour le voir, nous
luy proposâmes l'extirpation, ou l'application
des poudres caustiques, mais le malade ne
voulut jamais y consentir, ce qui fut cause
que la fièvre lente vint comme a l'ordinaire
la tumeur augmenta si prodigieusement que
toute la cuisse devint carcinomateuse et le
malade mourut dans le mesme j'y a
environ un an.

Cette observation constante et notoire
ne doit elle pas faire conclure que ce malade



auoit pu guérir une seconde fois par l'application
réitérée des poudres caustiques, avec les précautions
présentes, si l'auoit voulu se soumettre aussy tôt
que le tubercule parut?

La recidive montre clairement qu'elle n'a
été occasionnée que par l'aliance de l'humeur
qui étoit renfermée dans les vaisseaux obstrués
du Carcinome, qui étant rentrée en partie
par la voye de la circulation dans le commerce
du sang, l'auoit infecté de ce leuain, et disposé
à reproduire le même mal dans la partie où
l'humeur auoit déjà pris son cours ayant plus
de disposition à la recevoir que toute autre.

mais il est facile de voir que lorsque les
tumeurs de ce caractère sourent qu'elles
mêmes, et qu'il en soit une source ou virulence
infecte, que la fièvre lente a mis un malade
dans un état de marasme, et porté le mal
à son comble comme étoit notre malade, on
voit dès le l'impossibilité dans la guérison,
étant rare, que l'on puisse dompter les leuains
qui ont pris le dessus dans la masse du sang,
et qui se sont mis en action d'écluser les remèdes
les plus efficaces et les mieux concertés.

Ce qui vient d'être observé est toujours suffisant
pour prouuer que le cautère ou les caustiques
sont préférables à l'instrument tranchant
dans les tumeurs qu'on appelle fies, carcinomes,
et les cancers ulcérés, puisque la guérison
s'en est ensuivie dans le cas présent, le cas y
ayant toujours été contraire, mais ils n'empêchent
pas toujours la recidive de ces maux.

mais pour ce qui regarde les tumeurs occultes
l'instrument tranchant est toujours préférable

parce qu'on enleva. Comme on l'a déjà dit, tout à la fois la cause et l'effet de la tumeur, que la douleur passe plus vite et ne cause jamais de si fâcheux accidents, ce fait tire la preuve de l'observation suivante.

un habitant des environs de cette ville âgé de vingt Cinq ans nous auroit appelé vers le commencement de cette année, pour faire la visite d'une tumeur carcinomateuse. Située à l'ombilic de la grosseur d'un œuf de dinde, qu'il portoit depuis dix huit mois, de laquelle il n'avoit presque pas souffert excepté depuis environ deux ou trois mois, qu'il lui étoit survenu des douleurs si aiguës, qu'il fut ainsi tout hors d'état de rien faire. La tumeur commença à devenir rouge et enflammée le pouls devint intermittent, et la fièvre se joignit à ces accidents, le malade devint fort faible et inquiet ressentant des douleurs profondes et fort vives dans les bras, et dans les jambes, qui étoient occasionnées par les elancements qu'il disoit ressentir dans la tumeur.

Dans cet état il fut consulté dans une assemblée de M^{rs} les medecins et Chirurgiens de cette ville d'extirper cette tumeur, qui alloit prendre incessamment la tournure d'un cancer, en faisant des précautions nécessaires pour éviter les parties flottantes du bas ventre, dont il y avoit lieu de soupçonner un engagement, par rapport à l'anneau ombilical, qui auroit pu faciliter leur passage.

nous nous munîmes de tout ce qui peut être nécessaire dans de pareils cas; après avoir fait une incision dans la partie inférieure de la tumeur avec un bistouri droit, et l'avoir doucement décollée pour passer le doigt indice, nous nous assurâmes qu'il n'y avoit aucune saillie des parties flottantes,



nous continuâmes à distiquer la tumeur jusqu'à ce
que nous l'eumes entièrement détachée des muscles
droits, nous donnâmes ensuite à la plaie une figure
oblongue en coupant tous les teguments, avec la
tumeur, de cette sorte la plaie avoit environ huit
travers de doigts de long au travers de l'abdomen
et six de large, il n'y eut que deux artères qui
fournissoient à ce corps, on les arrêta au moyen
de deux points de ligature. Comme cette plaie
étoit monstreuse, et que le malade avoit été
tres long tems aguerri, et peut être une recidive
à craindre à cause d'un long pansement, et de
la disposition des mauvais sucs, nous nous
servîmes de quatre points de suture enchevillée
tant par rapport aux mouvemens des muscles de
l'abdomen, qui avoient été un obstacle à la réunion
de cette grande plaie, que pour en obtenir une
plus prompte guérison, nous unîmes par dessus un
plumaceau couvert du baume de copahu, que
nous continuâmes pendant huit jours, observant
de faire des embrocations sur tout le ventre avec
de l'huile rosat, et de faire garder au malade
une situation couchée, les cuisses fort pliées,
afin d'éviter les tiraillemens de la suture, il fut
au bouillon pendant dix jours consécutifs, il n'eut
que trois jours de fièvre depuis l'opération, —
laquelle fut éteinte au moyen de trois ou quatre
saignées, nous coupâmes ensuite les fils de la
suture le neuvième jour, ceux des artères étant
tombés le septième, depuis nous pansâmes
la plaie que nous trouvâmes pres^{que} consolidée
avec le baume des larmes de pin, le malade
fut entièrement guéri le dix huitième jour, et fut
en état de s'en aller de son pied à une lieue de

de la ville le vingt troisieme jour depuis l'operation
ayant la cicatrice bien ferme et unie, tant
dailleurs dans un meilleur embonpoint qu'avant
la naissance de son mal; il est a remarquer que
les vives douleurs qu'il ressentoit aux bras, et
dans les jambes, disparurent absolument, quatre
jours apres l'operation, et que cet homme qui est
de son metier laboureur, s'occupe actuellement
aux travaux les plus penibles de la terre sans
rien ressentir de son ancienne incommodité.

Nous finirons cette petite dissertation par
un fait de pratique, qui quoique different du sujet
de la question, nous paroit devoir estre communiqué
a l'academie.

nous aurions été appelés le mois de mars de la
presente année par un marchand de cette ville
pour traiter un oeil, qu'il s'étoit imprudemment
poché luy meme en dormant un coup d'une
petite baguette qu'il tenoit entre ses mains
laquelle en se repliant se cassa avec un si grand
effort, qu'il en entra un morceau dans le globe
de l'œil gauche a quatre lignes de la cornée du
côté du grand canthus, apres avoir coupé totalement
le cartilage de la paupiere supérieure; lequel
morceau de bois avoit pénétré jusqu'à l'humour
vitree, l'humour aqueux ayant été repandue
dans le moment, il se fit une grande confusion
accompagnée d'une grande vive douleur qui continua
neuf ou dix jours, le dedans de l'œil se laint
rempli de sang et la pupille absolument dilatée
nous parvîmes le dedans de l'œil avec du sang de
pigeon trois fois par jour, afin de resoudre le sang
épanché derrière la cornée, nous mimes sur



La playe de la paupiere, un petit plumaceau chargé de baume de copahu, et par dessus des Compresses mouillées avec de l'eau tiède, un cast d'eau vulnéraire, et quelques gouttes de baume du commandeur, nous mimes en usage la saignée que nous reiterames trois ou quatre fois dans vingt quatre heures, et mimes le malade au bouillon pendant neuf jours, et continuames les pancemens trois fois par jour de la meme maniere, observant de faire tenir le malade presque sur son seant, les rideaux de son lit et de la chambre bien fermés, afin que la lumiere ne blessât pas la foiblesse de l'oeuvée et de la retine.

Ce qu'il y a de plus considerable a remarquer dans cette observation, c'est que le lendemain de l'accident la prunelle devint presque anthy dilatée que toute l'étendue de la cornée transparente sans aucun mouvement de constriction; que l'humour vitrée sortoit par la playe du globe qui étoit de l'étendue de deux lignes et demie, et faisoit une espece d'hernie de la grosseur d'un gros poix, qui augmenta un peu les jours suivans, l'oeuvée disparut le cinquieme jour en faisant un étranglement a la saillie de l'humour vitrée, qui dura quatorse jours, et tomba ensuite d'elle meme, en ouvrant la paupiere pour pancer le dedans de l'œil, la playe n'étant pas bien cicatrisée, je continuay les pancemens avec le baume du commandeur l'eau vulnéraire et l'eau tiède jusqu'à ce que la playe fut entièrement consolidée, ce qui se fit huit jours apres la chute de l'humour vitrée, quoiqu'il

restait encore une elevation en forme de verrue
qui a été consumée par l'usage reiteré de l'eau
veste de hartman, que je mêlois avec un peu de
Camphre, d'eau de vie forte et l'eau ~~sublimée~~
d'euphrase et de fenouil, dans la vie de
fortifier la pupille qui restoit toujours fort
dilatée, n'ayant que peu de mouvement, ce qui
nous fit croire que la vie resteroit absolument
perdue, néanmoins, il vint une chaleur au dedans
du globe accompagnée d'un étincellement qui se
faisoit sentir plus de cinquante fois par jour
; depuis ce temps la qui étoit environ le vingt
huitième jour après l'accident le malade
commença à distinguer des objets confusément
le ressort de la pupille se faisant mieux sentir
et rapproché de la moitié de l'état naturel,
et d'après ce mouvement ~~augmenté~~ toujours
augmenté par l'application des remèdes spirituels
ensorte qu'il fait les mêmes fonctions de l'œil
malade, avec la même liberté que de l'œil sain
et restent encore plus dix fois par jour les mêmes
fusées dans le globe, lesquelles commencent
toujours par la playe, et font le tour de l'œil
en manière d'un cercle, ce que nous attribuons
à la blessure de la rétine et de l'oculée, lesquelles
membranes sont encore susceptibles de la même
impression des rayons de lumière, en tout cas
quand ce léger accident resteroit toute la vie
au malade, ce seroit toujours peu de chose
en regard au désordre des parties essentielles
à la vision.



je Sçay Messieurs, et je l'ay déjà dit, que
Cette observation est independante de notre
thèse, et si nous auons pris le parti de
vous La Communiquer, c'est pour répondre
entièrement a l'invitation que nous
auons receu de uotre part, de ne point
Cacher au public les faits de pratique
qui peuvent luy procurer quelque auantage,
Si ie n'ay point le bonheur de répondre
a uos desseins, par la beauté du langage,
le tour aisé, et le stile fleuri d'un
orateur, c'est que toutes ces choses
je ne rougis point de le dire, ne sont
point de mon art, trop heurux, si
je l'auois pu par la solidité de mes
raisonnemens, comme il est certain
que ie m'en suis acquitté par la uerité
de mes observations.

Secare malum